

PARTE 2

Tipos de exodoncia

2. Quirúrgica

➤ Indicaciones:

- Fracaso exodoncia simple
- Fractura durante exodoncia simple
- Caries subgingival
- Anatomía o morfología de las raíces complicada
- Reabsorción radicular
- Proximidad de estructuras anatómicas importantes
- Dientes endodonciados
- Dientes retenidos

➤ Materiales, preparación gabinete:

- Kit exploración + vaso, babero, eyector
- Bandeja anestesia
- Gasas
- Separadores
- Pinzas mosquito
- Mango bisturí + hoja
- Bisturí eléctrico
- Periostotomo
- Pinza gubia, escoplo y martillo
- Pieza de mano
- Fresa redonda de cirugía
- Turbina
- Fresas odontosección
- Botador
- Fórceps
- Lima hueso o raspador
- Legra
- Esponja hemostásica
- Sutura
- Portaaguja
- Pinzas Adson
- Tijeras de cirugía
- Bolsa fría
- Cánula quirúrgica para aspiración
- Sepadores:
 - Farabeuf. Para retraer los labios.

- Langenbeck. Para retraer colgajos.
- Minnesota. Para retraer colgajos.
- Gasas: limpiar superficies o instrumental manchado, así como para limpiar o ir secando el campo operatorio.
- Pinzas mosquito o hemostásicas. Curvas, rectas, con o sin dientes. OJO no igual portaagujas.

- Incisión y despegamiento colgajo:
 - Incisión: mango bisturí + hoja.
 - ❖ Nº15.
 - ❖ Portaagujas mayo para montar.
 - Despegamiento: periostotomo.
 - ❖ Bisturí eléctrico: gingivectomías.
- Osteotomía:
 - Eliminar hueso rodea diente cuando cubre total o parcial.
 - ❖ Manual: escoplo + martillo o pinza gubia.
 - ❖ Mecánica: pieza de mano + fresa redonda cirugía
- Odontosección:
 - Dientes multirradiculares, dientes con raíces divergentes o curvas, dientes con proximidad estructuras anatómicas, dientes anquilosados.
 - Cordal inferior.
- Exodoncia
- Regularización alveolo: lima de hueso o raspador.
- Legrado.
- Sutura

Indicaciones posquirúrgicas

1. No realizar movimiento bruscos ni ejercicios en 48 horas.
2. Mantener la gasa colocada sobre la herida de 30 a 60 minutos.
3. Aplicar hielo las primeras 24 horas. Alternando la colocación con la retirada del hielo.
4. No escupir ni enjuagarse las primeras 24 horas
5. Pasadas las primeras 24 horas es recomendable enjuagarse con agua salada (1 cucharadita de sal por cada litro de agua)
6. Llevar dieta blanda y fría o templada los primeros días
7. Dormir incorporado el primer día
8. No fumar el máximo de días posibles.

Complicaciones exodoncia

1. Hemorragia
 - Frecuente, no cumplir medidas el paciente: escupe.
 - Si hemorragia:
 - ❖ Calma + presión con gasa + agua oxigenada.
 - ❖ Amchafibrin (ácido tranexámico)

❖ Ácido aminocaproico

2. Dolor
 - Ojo con alveolitis
 - Ojo con AINES.
3. Recesión gingival
4. Alteraciones ATM
5. Comunicación bucosinusal: prueba Valsalva